

ACP TILONE 44* PREMIX

ANTIBIÓTICO DE AMPLIO ESPECTRO EN PREMEZCLA
(Tilosina 44%)
Número de registro Q-7654-084

FÓRMULA

Cada 1000 g de **ACP TILONE 44* PREMIX** contienen:

Tilosina Fosfato	440 g
Excipiente c.b.p.	1000 g

DEFINICIÓN

La Tilosina, es un antibiótico del grupo de los macrólidos que se caracteriza químicamente por poseer un anillo lactona sumamente grande en su estructura. Al igual que los demás macrólidos, se obtiene de una cepa de *Streptomyces fradiae*.

MODO DE ACCIÓN

La Tilosina se considera de igual forma un bacteriostático (interfiere con la producción de proteínas, afectando la subunidad ribosomal 30s).

INDICACIONES

ACP TILONE 44* PREMIX está indicado contra microorganismos Gram-negativos y Gram-positivos, con especial acción en la prevención y tratamiento de la Enfermedad Crónica Respiratoria (ECR) causada por *Mycoplasma gallisepticum* y *Mycoplasma synoviae* en aves. Se utiliza también como promotor de crecimiento en pollos de engorda y mejorador de la conversión alimenticia.

Indicado para tratar Disentería Porcina asociada a *Brachyspira hyodysenteriae*; además actúa contra los microorganismos sensibles a la tilosina en los cerdos como *Mycoplasma hyopneumoniae*, *Mycoplasma hyorhinis*, *Bordetella bronchiseptica*, *Staphylococcus aureus* y *Erysipelothrix rhusiopathiae*.

DOSIS

Porcinos:

Tratamiento terapéutico y/o metafiláctico de Enteritis Proliferativa Porcina: 200 g. (equivalente a 88 g. de Tilosina) por tonelada de alimento durante 10-14 días.

Tratamiento de Neumonía Enzoótica o Disentería Porcina: 2-4 mg/Kg. cada 24 horas durante 10 a 14 días.
250 g. (equivalente a 110 g de Tilosina) por tonelada de alimento durante 10 a 14 días.

Aves:

Tratamiento terapéutico y/o metafiláctico en pollo de engorda: 25 a 125 g. (equivalente a 11-55 g. de Tilosina) durante 3 a 5 días.

Tratamiento terapéutico y/o metafiláctico de ERC en pollo de engorda: 2 a 2.5 Kg. (equivalente a 880 a 1,100 g. de Tilosina) por tonelada de alimento durante 3 a 5 días.

La duración y frecuencia del tratamiento queda a recomendación del Médico Veterinario.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Oral, mezclado en el alimento terminado.

PRESENTACIÓN

Saco de 5,10 y 25 kg.

ADVERTENCIAS

- No administrar este producto 7 días previos al sacrificio de los animales destinados al consumo humano.
- No se administre en aves de postura.

PRECAUCIONES

- Asegure una distribución uniforme del producto en el alimento terminado. Se recomienda realizar una premezcla con alguno de los ingredientes mayoritarios del alimento, para luego incorporarlo al resto de la ración.
- Use guantes y mascarilla durante la manipulación del producto.
- Producto de uso exclusivo en Medicina Veterinaria.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- Consérvese en lugar fresco y seco a temperatura no mayor a 30°C
- Protéjase de la luz directa.
- Manténgase fuera del alcance de los niños y de animales domésticos.
- Mantener el envase bien cerrado después de cada uso.
- No reutilice el envase. Deseche el envase vacío conforme a la legislación ambiental vigente.

Su Venta Requiere Receta Médica.

Consulte al Médico Veterinario.

Hecho en México para:
Animal Care Products S.A. de C.V.